



Carga Socioeconómica del TDAH en adultos en España

weber





Copyright© 2024 Takeda Pharmaceutical Company Limited.
All rights reserved. Takeda and the Takeda Logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited.


¿Qué es el TDAH? Un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por síntomas de **falta de atención, hiperactividad e impulsividad** que interfieren en la vida del paciente¹


¿Qué impacto tiene? Los síntomas del TDAH suponen una **carga elevada** para los **pacientes y la sociedad** en general, tales como dificultades de aprendizaje, inestabilidad laboral, problemas económicos, relaciones conflictivas con otras personas, adicciones, consumo de sustancias tóxicas, delincuencia, etc.¹


IMPACTO DEL TDAH


 **64,4%** han visto afectado su éxito profesional²


 **20,8%** tiene problemas con el consumo de cocaína⁴

 **63,2%** tienen problemas con sus relaciones sociales²

 Los pacientes con TDAH tienen un riesgo **5,9** veces mayor de suicidio que una persona sin TDAH⁵

 **86,4%** presentan comorbilidades en general³

 **19,6%** presenta problemas de alcoholismo²

 **66,2%** tienen al menos una comorbilidad psiquiátrica⁴

 **48,3%** fuma²

PREVALENCIA Y RETRASO EN EL DIAGNÓSTICO



- La **prevalencia estimada en España** es del **3,3%** de la población adulta⁶
- El diagnóstico es en muchas ocasiones tardío: el **51,9%** de los pacientes adultos con TDAH tenían **18 años o más en el momento del diagnóstico**³
- La complejidad del diagnóstico de TDAH supone un retraso tanto del diagnóstico como del tratamiento, lo que contribuye al incremento de la carga de la enfermedad⁷



Retraso del diagnóstico




Retraso del Tratamiento



CARGA ASOCIADA AL ÁMBITO SANITARIO⁸



- El coste mínimo para el **diagnóstico de TDAH** se estima en **577 €** por persona
- En el **primer año tras el diagnóstico**, el coste del abordaje del TDAH se estima en **3.534 €** por persona
- En **años posteriores**, bajaría ligeramente hasta los **3.396 €** anuales por paciente
- Las **hospitalizaciones** suponen más del **50%** del coste
- La **medicación** solo supone el **10%** del coste





Carga Socioeconómica del TDAH en adultos en España

weber




Copyright© 2024 Takeda Pharmaceutical Company Limited.
All rights reserved. Takeda and the Takeda Logo are trademarks of Takeda Pharmaceutical Company Limited.

CARGA ASOCIADA AL ÁMBITO SOCIAL⁸




- Se estima en **4.438 € anuales por paciente**, ligados principalmente a consumo de sustancias y, en menor medida, relaciones con otras personas
- Puede incrementarse **431 € de manera puntual** por divorcio y suicidio



CARGA ASOCIADA AL ÁMBITO LEGAL⁸




- Se estima en **23 € anuales por paciente** vinculado a multas de tráfico
- Puede incrementarse **3.351 € de manera puntual** vinculadas principalmente a estancias en prisión y retiradas del carné de conducir



CARGA ASOCIADA AL ÁMBITO ECONÓMICO⁸



- Se estima en **7.795 € anuales por paciente**, principalmente debido al **absentismo laboral**




CARGA TOTAL POR PACIENTE⁸



- El **coste total anual por paciente** puede ascender a **15.652 €: 21,7%** en carga sanitaria, **28,4%** en carga social, **49,8%** en carga económica y **0,1%** en carga legal
- Adicionalmente podría haber un **coste puntual por paciente** de **7.893 €: 52,1%** en carga sanitaria, **42,5%** en carga legal y **5,5%** en carga social

CARGA TOTAL EN ESPAÑA⁸



- El TDAH en adultos supone una gran carga para el sistema sanitario y la sociedad, ya que impacta en casi todos los aspectos de la vida adulta de los pacientes, incluidos los aspectos sociales, laborales y legales
- Son esenciales, por tanto, estrategias de diagnóstico y tratamiento temprano para reducir la carga del TDAH en adultos

Referencias

- Kooij JJS, Bijlenga D, Salerno L, Jaeschke R, Bitter I, Balázs J, et al. Updated European Consensus Statement on diagnosis and treatment of adult ADHD. *Eur Psychiatry* 2019;56:14-34.
- Able SL, Haynes V, Hong J. Diagnosis, treatment, and burden of illness among adults with attention-deficit/hyperactivity disorder in Europe. *Pragmatic Obs Res* 2014;5:21-33.
- Caci H, Asherson P, Donfrancesco R, Faraone SV, Hervas A, Fitzgerald M, et al. Daily life impairments associated with childhood/adolescent attention-deficit/hyperactivity disorder as recalled by adults: results from the European Lifetime Impairment Survey. *CNS Spectr* 2015;20(2):112-21.
- Piñeiro-Dieguez B, Balanzá-Martínez V, García-García P, Soler-López B. Psychiatric Comorbidity at the Time of Diagnosis in Adults With ADHD: The CAT Study. *J Atten Disord* 2016;20(12):1066-75.
- Ljung T, Chen Q, Lichtenstein P, Larsson H. Common etiological factors of attention-deficit/hyperactivity disorder and suicidal behavior: a population-based study in Sweden. *JAMA Psychiatry* 2014;71(8):958-64.
- Fayyad J, Sampson NA, Hwang I, Adamowski T, Aguilar-Gaxiola S, Al-Hamzawi A, et al. The descriptive epidemiology of DSM-IV Adult ADHD in the World Health Organization World Mental Health Surveys. *ADHD Atten Deficit Hyperact Disord* 2016;9:47-65.
- Ginsberg Y, Quintero J, Anand E, Casillas M, Upadhyaya HP. Underdiagnosis of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Adult Patients: A Review of the Literature. *Prim Care Companion CNS Disord* 2014;16(3):PCC.13r01600.
- Merino M, Maravilla-Herrera P, Lorenzo TM, Arance JA, Bobes J, Corrales M, et al. The socioeconomic burden of adult attention-deficit/hyperactivity disorder in Spain. *Glob Reg Health Technol Assess* 2024;11:82-93.